

# Zadanie 56 z “Okolo dwustu łatwych zadan z jezykow formalnych i zlozoności obliczeniowej (i jedno czy dwa trudne) 2020 edition”

Łukasz Klasiński

30 marca 2020

## Zadanie 56.

Wiadomo z jednego z poprzednich zadan, że jezyk  $L \subseteq \Sigma^*$  jest regularny, to również jezyk

$$L/2 = \{w \in \Sigma^* : \exists v \in \Sigma^* |w| = |v| \wedge wv \in L\}$$

jest regularny.

Pokaż, że podobna implikacja nie zachodzi dla jezykow bezkontekstowych. To znaczy istnieje taki CFL  $L$ , dla którego  $L/2$  nie jest CFL.

## Rozwiązanie.

Najpierw musimy znaleźć odpowiedni  $L$ . Jego budowa musi być taka, aby łatwo było “wypompować” brak bezkontekstowości odpowiadającemu mu  $L/2$ .

Niech takim jezykiem będzie:

$$L = \{a^n b^m c^m d^{3n} \mid m, n \in \mathbb{N}\}$$

Możemy do niego bardzo łatwo stworzyć akceptujący go jezyk CFG, co wykazuje bezkontekstowość:

$$T = \{a, b, c\}$$

$$N = \{S, B\}$$

$$\Pi = S \rightarrow aSddd \mid B, B \rightarrow bBc \mid \varepsilon$$

Ponieważ do udowodnienia tego, że w takim przypadku  $L/2$  nie będzie CFL skorzystamy z twierdzenia o pompowaniu dla jezykow bezkontekstowych (którego nie zdążyliśmy pokazać na wykładzie), przypomnijmy jego treść:

### Lemat o pompowaniu dla jezykow bezkontekstowych

Dla każdego jezyka bezkontekstowego  $L$  istnieje taka stała  $n$ , że dla każdego słowa  $w$  należącego do tego jezyka o długości co najmniej  $n$ , możemy podzielić to słowo na  $uvtxy$  w taki sposób, że:

- $|vx| > 0$
- $|vtx| \leq n$
- $\forall k \in \mathbb{N} uv^k tx^k y \in L$ , w szczególności  $uty \in L$

### D-d, że dla naszego $L$ , $L/2$ nie jest CFG

Załóżmy nie wprost, że  $L/2$  jest CFG. Wtedy istnieje dla niego stała z lematu o pompowaniu -  $n$ .

Rozważmy:

$$w = a^n b^n c^n$$

Oczywiście  $w \in L/2$ , ponieważ z definicji  $L/2$  mamy:  $|w| = |v| : v = d^{3n}, w \wedge wv \in L$

Podzielmy nasze słowo  $w$  na  $uvtxy$  i zauważmy, że ponieważ  $|vtx| \leq n$ , to  $vtx$  może składać się tylko z pojedynczych symboli albo dwóch sąsiadujących.

Otrzymujemy zatem przypadki:

1.  $vtx = a^k : k \leq n$ , wtedy otrzymujemy słowo:  $w' = a^{n+k}b^nc^n$ .

Założmy, że  $w' \in L/2$ . Wtedy z definicji  $L/2$ , musi istnieć słowo  $w''v \in L$  takie, że  $|w''| = |v|$ . Jedyne słowo  $w'' \in L$  które to spełnia, jest równe:

$$w'' = a^{n+k}b^nc^nd^{3(n+k)} = w''v$$

Ale wtedy  $|v| = 3n + 3k$ , a  $|w''| = 3n + k$ , zatem dla dowolnego  $k > 0$  otrzymujemy sprzeczność

2.  $vtx = b^k$  - pompujemy  $uv^0tx^0y$  o "zero", wtedy  $w$  będzie postaci  $a^nb^mc^n$ , gdzie  $m < n$ . Zatem takie słowo nie należy do  $L/2$ , ponieważ w słowie wystąpi więcej  $c$  niż  $b$ .
3.  $vtx = c^k$  - pompujemy  $uv^2tx^2y$  i otrzymujemy słowo  $w'$ , które zawiera więcej  $c$  niż  $b$ , zatem  $w'$  nie może należeć do  $L$ .
4.  $vtx = a^kb^j : k + j \leq n$  - podobnie jak w (2) pompujemy  $uv^0tx^0y$  i otrzymujemy więcej  $c$  niż  $b$  w słowie wynikowym, zatem  $w'$  nie może należeć do  $L/2$
5.  $vtx = b^kc^j$  - mamy podprzypadki:
  - $k > j$  - postępujemy jak w (2)
  - $k < j$  - postępujemy jak w (3)
  - $k = j$  - otrzymamy słowo:  $w' = a^nb^{n+k}c^{n+k}$ .

Założmy, że  $w' \in L/2$ . Wtedy podobnie jak w (1) musi istnieć słowo

$$w'' = a^nb^{n+k}c^{n+k}d^{3n} = w''v$$

Ale  $|v| = 3n$ , a  $|w''| = 3n + 2k$ , zatem dla dowolnego  $k > 0$  otrzymujemy sprzeczność

Ponieważ w każdym przypadku istnieje  $k$ , dla którego wyprowadzone  $w'$  nie należy do  $L/2$ , to nie jest on bezkontekstowy.

□